

LACTOFILUS
(LACTOBACILOS ACIDOFILOS)
ANTIDIARREICO

COMPOSICIÓN (Contenido por gramo): Lactobacilos acidófilos, 120 millones. Excipientes: Lactosa 795 mg y Aerosil c.s.p.

FORMA FARMACEÚTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE: Frasco conteniendo 20 g de polvo liofilizado oral.

ACTIVIDAD: La alteración o desaparición de la flora acidófila intestinal normal, que ocurre en el curso de enfermedades gastroentéricas o durante el tratamiento con antibióticos, se manifiesta por síntomas variados, que responden a la reposición de la misma. Lactofilus restaura la flora intestinal porque contiene, en forma liofilizada, el elemento necesario: Lactobacilos acidófilos, huésped habitual del intestino humano.

TITULAR: INSTITUTO LLORENTE, S.A., Montevideo, 33 - 28020 Madrid.

INDICACIONES: Tratamiento sintomático de los procesos diarreicos agudos o repentinos. Prevención y tratamiento de las diarreas producidas por la administración de antibióticos.

CONTRAINDICACIONES: No se han descrito.

PRECAUCIONES: Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe consultar a su médico.

ADVERTENCIAS: No usar más de 2 días con fiebre alta o en niños menores de 3 años sin consultar con el médico.

IMPORTANTE PARA LA MUJER: Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

POSOLOGÍA: Adultos: 4 a 6 cucharaditas de las de café al día. **Niños:** 2 a 4 cucharaditas de las de café al día. (Una cucharadita de las de café equivale, aproximadamente, a 3 g). El producto se mezclará, preferentemente, con pequeñas cantidades de leche o agua fría. Una vez sacada del frasco la cantidad de Lactofilus a emplear, cerrarlo herméticamente para evitar que el producto absorba humedad. Después de abrir el frasco su contenido permanece activo durante una semana.

SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: No se ha descrito. En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS: No se han descrito. Debe comunicar a su médico o a su farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrito en el prospecto.

CADUCIDAD: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

CONSERVACIÓN: Consérvese en frigorífico. Una vez abierto el frasco, el plazo de validez es de 7 días.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

SIN RECETA MÉDICA
CPS: M-10052